




Tumeurs solides rares du pancréas


les métastases pancréatiques sont généralement observées dans les cancers bronchiques ,les mélanomes et les adénocarcinomes du rein



métastases d'un adénocarcinome rénal 8 ans après l'intervention




métastases d'un adénocarcinome rénal





CT 45"



CT 45"



CT 45"




T1 10'


métastases pancréatiques hyper vascularisées
synchrones d'un adénocarcinome rénal




CT 45"




T1 1'




T1 1'



T1 1'



T2 TE court




T2 TE long

métastases d'un adénocarcinome rénal 2 ans après
l'intervention ; retentissement canalaire pancréato-
biliaire

CT 45"



CT 45"




CT 1'30



CT 1'30

métastases pancréatiques de
carcinomes bronchiques




T2 TE long



CT 7'



métastases pancréatiques de
mélanome

les lymphomes primitifs du pancréas sont rares et généralement observés dans un contexte particulier : immunodépression SIDA






CT 3'

LMNH primitifs HIV+




CT 2'




CT et MPVR 70"

LMNH secondaire " péri pancréatique"









neurofibromes (névrome plexiforme) ;
neurofibromatose type I


CT et MPVR 70"



les tumeurs conjonctives du pancréas sont très rares






schwannome pancréatique



CT
45"






T1
45"



CT 1'30

angiographie numérisée

angiome (malformation artério-veineuse) du pancréas








homme 56 ans tabagique douleurs de l'hypochondre
droit par crises de 2 ou 3 jours depuis 6 mois

sur jn suivi de 6 mois 2 cyto ponctions puis DPC




obs B Dupas Nantes




(pseudo)tumeur inflammatoire
myofibroblastique

IHC : actine musculaire lisse +

obs B Dupas Nantes





tumeur fibreuse solitaire du pancréas (T myofibroblastique)

Au total

les TNE non fonctionnelles du pancréas sont soupçonnées sur la discordance entre la taille de la lésion , son éventuelle dissémination métastatique et son retentissement clinique modéré .

Le degré d'hyperavasularisation reflète la différenciation

Les places respectives de la scintigraphie aux analogues de la somatostatine (octréotide marqué à l'¹¹¹Indium) et du PET CT au 18 FDG restent à préciser

les métastases au pancréas sont surtout le fait des cancers du rein et du poumon . On les observe également dans les phases terminales des cancers du sein et des mélanomes

le LMNH primitif du pancréas s'observe surtout dans un contexte de déficience immunitaire ; les formes secondaires se développent à partir des ganglions péripancréatiques