

DIU Thorax
Corrélations anatomo-physio-pathologiques
en imagerie thoracique

Imagerie de la maladie thrombo-embolique, de l' HTAP et de la maladie veino-occlusive


TISSIER S

- Avril 2011 -


- Imagerie médicale -

- CHU Nancy / Brabois -


- 2 réseaux artériels : pulmonaire / bronchique




HTAP



**Primitive
secondaire**






**Pré-capillaire
Et/ou
Post-capillaire**



Circulation bronchique :



Face latérale ou antérieure de l'aorte thoracique

Accessible au scanner multicoupe



principaux caractères radiologiques de l' HTpulmonaire



l' aspect typique de l' hypertension pulmonaire associe une dilatation des artères pulmonaires proximales qui contraste avec l'effilement rapide de leurs segments distaux



**hypertension artérielle pulmonaire
primitive 25 ans H**
aorte 25 mm
tronc artère pulmonaire 32 mm


-la mesure sur la RT est plus facile au niveau des artères interlobaires ; en regard de la bronche intermédiaire . Diamètre maxi : **16 mm chez l'homme ; 15 mm chez la femme**

-sur l'imagerie en coupes (CT et MR) l'hypertension pulmonaire doit être évoquée **si le diamètre du tronc de l'AP est > 28 mm ou s'il est > à celui de l'aorte.**




**hypertension artérielle
pulmonaire primitive**

- la dilatation des branches segmentaires des artères pulmonaires se diagnostique en comparant leur diamètre à celui de la bronche homologue adjacente. La présence d'un **rapport > 1.1 dans 3 des 4 lobes** est hautement suggestif d'une hypertension



- l'**hypertrophie ventriculaire droite**, l'inversion de courbure du septum interventriculaire, l'élévation du signal intravasculaire dans les segments proximaux des artères pulmonaires, du au flux ralenti en IRM pondérée T1 sont des éléments classiques




HTAP

Pré-capillaire

Pcap N




P°diast Pulm ↗



épidémiologie des HTAP primitives

- HTAPP : sporadique ou familiale (6% des HTAPP)
- incidence annuelle : 1 à 2 nouveaux cas/an/million d'habitants (*600 à 700 cas en France dont 120 à 140 nouveaux/an*)
- sex ratio : 2 femmes/1 homme
- âge moyen au diagnostic : 40 ans (25-45 ans)
- délai entre 1° symptômes et diagnostic : 2,5 ans dyspnée d'effort ; caractère insidieux +++.

survie moyenne : 2,8 ans sous traitement conventionnel
(D'Alonzo *et al.*, Ann Intern Med 1991; 115 : 343-9)



HTAP typique



Malformation congénitale cardiaque

Ex. Shunt **Gauche-Droit** (transposition des gros vaisseaux)

Maladie embolique / vasculaire

- maladie thrombo-embolique (MTE) +++
- Embolie tumorale, gazeuse, graisseuse, amniotique
- Infectieuse (parasitaire : shistosomiase cardio-pulmonaire)
- Corps étranger
- Vascularite
- Talcose pulmonaire

Affection pleuro-pulmonaire primitive

- Emphysème , atteinte restrictive (**fibrose**)
- Atteinte parenchymateuse diffuse
- Hypoventilation alvéolaire


Pathologie embolique pulmonaire :

Particularités de l'exploration et de l'interprétation en imagerie TDM moderne

augmentation brutale de la pression dans ces vaisseaux. Cette hausse pressionnelle - que le cœur doit combattre pour assurer la circulation - peut conduire à l'arrêt cardiaque. »

vaisseaux. Cette hausse pressionnelle - que le cœur doit combattre pour assurer la circulation - peut conduire à l'arrêt cardiaque. »

Picot 1884



61
08/HE+ 55.0mmVol
1.3751/1.0sp
9 PM

Pathologie pulmonaire embolique

Objectifs

- 1/** Savoir reconnaître les conséquences en particulier cardiaques d' embolie pulmonaire (EP) crurorique ainsi que ses causes cardio-thoraciques.
- 2/** Reconnaître les EP non cruroriques.
- 3/** Connaître les particularités cardio-pulmonaires de l' EP chronique.
- 4/** Savoir adapter le protocole d' acquisition tomодensitométrique dans ces conditions.

Pathologie pulmonaire embolique

Plan

1/ Généralités

2/ Diagnostic positif

- Embolie pulmonaire aiguë
- Embolie pulmonaire chronique ou cœur pulmonaire chronique post-embolique
- Conséquences pleuro-parenchymateuses
- Conséquences cardio-vasculaires

3/ Diagnostic étiologique

4/ Pièges d'interprétation

- facteurs patients-dépendants techniques, anatomiques et pathologiques

5/ Protocoles d'examen

6/ Pronostic de la maladie thrombo-embolique

Pathologie pulmonaire embolique

Généralités

La maladie thrombo-embolique est la 3^{ème} cause la plus fréquente de pathologie cardio-vasculaire aiguë (après l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux). 15% des patients qui décèdent de cause inconnue en hospitalisation présenteraient une embolie pulmonaire (EP). L'EP est la principale cause non néoplasique de mortalité des patients atteints de cancer.

Durant les 10 dernières années l'apport du scanner spiralé et surtout volumique multicoupe, dans le diagnostic d'embolie pulmonaire s'est rapidement imposé comme l'examen de première intention.

La question n'est plus de démontrer son intérêt en pratique clinique dans le diagnostic positif mais de l'intégrer en temps qu'examen « All in One » dans le processus décisionnel de la prise en charge du patient présentant une embolie pulmonaire. En effet le scanner volumique moderne fournit d'importantes informations concernant la maladie thrombo-embolique, ses causes ainsi que ses conséquences.

Pathologie pulmonaire embolique

Généralités

Les améliorations techniques rapides du scanner volumique ont nettement amélioré la qualité image (augmentation des résolutions spatiale et temporelle). Les artefacts de volume partiel sont moins fréquents, les temps d'acquisition réduits permettent une exploration optimale des patients dyspnéiques.

Scanner	Sensibilité	Spécificité
Spiralé	53-91%	78-97%
Multidétecteur	83-100%	89-97%

Une récente méta-analyse (concernant l'élimination du diagnostic d'embolie pulmonaire aigue, chez 3500 patients avec un suivi de 3 mois) montre une validité clinique de l'angioscanner des artères pulmonaires similaire à celle de l'angiographie numérisée.

L'avantage considérable de la technique scanographique est de ne pas simplement visualiser le thrombus intra-vasculaire pulmonaire, mais de pouvoir offrir un diagnostic différentiel ou additionnel, et d'analyser les éventuelles conséquences cardiaques de la maladie thrombo-embolique.

Pathologie pulmonaire embolique

Définition

Embolie pulmonaire :



migration dans l'arbre artériel pulmonaire d'un corps étranger, entraînant une oblitération brutale totale ou partielle du tronc ou d'une des branches de l'artère.

✓ **Caillot fibrino-cruorique**

- Origine : phlébite des membres inférieurs (80%)
- Étage sus / sous poplité
- plus rarement pelvien

✓ **Autres :**


- Emboles graisseux, tumoraux, infectieux, etc....



Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

→ **Occlusion totale** d'une branche artérielle pulmonaire avec augmentation du calibre artériel




Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

→ **Occlusion partielle centrale** d'une branche artérielle pulmonaire : 2 aspects typiques de visualisation de l'embole cruorique

Image "en **cible** » en coupe petit axe vasculaire

Image "en **rail** » en coupe vasculaire longitudinale.




Images en « rail »

Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

→ **Occlusion partielle marginalisée** d'une branche artérielle pulmonaire : L'embolie crurorique est marginalisée en périphérie du vaisseau formant un **angle aigu** avec les parois le plus souvent associé à un aspect "en selle d'éléphant".




Pathologie pulmonaire embolique

Maladie thrombo-embolique aiguë

Une acquisition sans injection en dehors d'un diagnostic différentiel peut montrer une embolie pulmonaire récente grâce à l'hyperdensité spontanée du « sang frais »

Hyperdensité
spontanée du
thrombus fibrino-
cruorique récent





Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

2 tableaux clinico-radiologiques directement liés à l'importance du territoire amputé:

→ Embolie pulmonaire proximale

- Atteinte du tronc de l'AP ou des artères pulmonaires droite ou gauche (volumineux thrombus ou embolies à répétition et obstruction progressive)
 - Haut risque de retentissement cardiaque voire de défaillance (cœur pulmonaire aigu) et altération de l'hématose
- Symptomatologie :
 - douleur latéro-thoracique brutale, syncopale
 - état de choc
 - dyspnée et cyanose intense
 - installation rapide d'une défaillance cardiaque droite aiguë
 - **signes cardiaques** : tachycardie rapide ou tachyarythmie, galop droit de siège xiphoïdien, éclat de B2 au foyer pulmonaire
 - **signes périphériques** : collapsus tensionnel, turgescence des jugulaires, hépatomégalie douloureuse, reflux hépato-jugulaire.



Embolie pulmonaire proximale
avec aspect typique « en selle »



Embolie pulmonaire proximale sévère avec
atteinte du tronc de l'artère pulmonaire





Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

2 tableaux clinico-radiologiques directement liés à l'importance du territoire amputé:

→ **Embolie pulmonaire distale** (70 à 75% des cas).

- Atteinte d'une ou plusieurs branches distales, à prédominance basale, à droite plutôt qu'à gauche
- Symptomatologie fonctionnelle riche en raison de l'**infarctus pulmonaire de Laennec** pouvant associer lésion parenchymateuse (40%), effusion pleurale (43%) et anomalie diaphragmatique (40%)
- Symptomatologie :
 - fébricule décalé et sueurs
 - sensation de « mort imminente »
 - point de côté brutal
 - toux
 - dyspnée plus ou moins intense
 - crachats hémoptoïques décalés



Embolie pulmonaire distale et
infarctus de Laennec bilatéral

Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

Problème des embolies distales :


- Selon les études, les embolies sous segmentaires concerneraient 2 à 33% des suspicions d'embolies et seraient liées à la migration de thrombus de petite taille (phlébite jambière)
- Les embolies sous segmentaires ont longtemps été la limite du scanner spiralé faisant diminuer sa sensibilité diagnostique **de 90% à 66%.**
- L'avènement des scanners volumiques multicoupes et des collimations infra-millimétriques permet aujourd'hui un diagnostic beaucoup plus fiable de la lumière **des artères de 5^{ème}, 6^{ème} voire 7^{ème} ordres.**
- Leur diagnostic reste important en raison de la capacité connue de ces embolies périphériques à déstabiliser un état pulmonaire précaire et du risque de récurrence.
- Les critères diagnostiques demeurent identiques.

Critères diagnostiques positifs



Pathologie pulmonaire embolique aiguë

Critères diagnostiques des embolies pulmonaires sous segmentaires :

- **signe direct** : defect intra-luminal souvent central.
- **signe indirect** : asymétrie de rehaussement de branches distales de même ordre (attention aux pièges)



Emboles sous segmentaires




Emboles sous segmentaires bilatérales
(petit et grand axes vasculaires)

Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique chronique

→ **Occlusion totale** d'une branche artérielle artérielle pulmonaire avec diminution du calibre du vaisseau






Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique chronique

Occlusion partielle d'une branche artérielle pulmonaire :

- Defect luminal plutôt périphérique « en croissant » pariétal, réalisant un angle obtus par rapport à la paroi artérielle




Embolie pulmonaire chronique
marginalisée en périphérie du vaisseau

Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique chronique

- **Occlusion partielle** d'une branche artérielle pulmonaire :
- Images de pseudo-épaississement pariétal plus ou moins circonférentiel en cas de recanalisation centrale d'un thrombus.




Critères diagnostiques positifs

Pathologie pulmonaire embolique chronique

Occlusion partielle d'une branche artérielle pulmonaire :




- Images de pseudo-membrane flottante ou de calcifications au sein d'un épaississement excentré.



Critères diagnostiques positifs

Synchronisation ECG

L'utilisation d'un gating et de paramètres d'acquisition de type scanner cardiaque permet d'obtenir une très bonne résolution spatiale et temporelle pour l'analyse de la distalité des artères pulmonaires. Ce type d'acquisition avec protocole d'injection non spécifique autorise une étude de l'aorte, des artères coronaires et des artères pulmonaires, notamment en cas de doute étiologique face à une douleur thoracique.








Embolies pulmonaires +/-
distales lors d'examens
synchronisés

Avantages de la synchronisation ECG:

- Meilleure résolution temporelle
- Meilleure résolution spatiale (en FOV adaptée)
- Fonction VD/VG
- Diagnostic différentiel (coronaires, aorte)

Inconvénients :

- Durée d'acquisition plus longue (apnée)
- Qualité d'image dégradée si tachycardie ou arythmie
- Irradiation +++



Sommaire

Douleur thoracique chez un patient porteur de pontages aorto-coronariens (MIG-IVA, veineux aorto-diagonale et MID-latérale du bord gauche)

Critères diagnostiques positifs

Conséquences pleuro-parenchymateuses

✓ **Constitution d'un infarctus de Laennec :**

Il s'agit d'une zone hyperatténuante triangulaire à base pleurale, dans le territoire vasculaire artériel amputé correspondant à une nécrose hémorragique de type infarctus rouge, en raison de la double circulation pulmonaire (systémique bronchique et pulmonaire).

L'obstruction de l'artère pulmonaire provoque une vasoconstriction artériolaire (phénomènes neuro-végétatifs) dont le résultat est une anoxie avec nécrose ischémique des cloisons alvéolaires. Par phénomène reflexe, ouverture des anastomoses normalement fermées entre les artères bronchiques, l'artère et la veine pulmonaire. L'anoxie des cellules endothéliales des capillaires alvéolaires entraîne une vasodilatation réflexe: celle-ci, associée à l'ouverture des anastomoses, permet l'inondation sanguine du territoire nécrosé quand il existe une stase pulmonaire.

Résorption en 4 à 8 semaines (« Melting sign » de Woesner) avec image séquellaire plutôt linéaire, parfois rétractile et tatouée d'hemosidérine.

Critères diagnostiques positifs

Conséquences pleuro-parenchymateuses








- ✓ **Epanchement pleural réactionnel** (dans 30 à 60% des cas)
→ soit inflammatoire, soit hémorragique.

- ✓ **Hémorragie alvéolaire / alvéolite hémorragique**

Elle se manifeste par des plages "en verre dépoli » typiques du tapissage alvéolaire hématique .




Elles sont situées aux alentours d' un infarctus pulmonaire histologiquement rouge (double circulation artérielle pulmonaire) lié à l' infiltration hémorragique du territoire nécrosé.

- ✓ **Atélectasie linéaire** aiguë ou séquellaire d' infarctus. Plus rarement elle prend la forme d' une atélectasie ronde pseudo-tumorale.




Embolie pulmonaire
aiguë compliquée d'un
infarctus typique **rouge**

Infarctus pulmonaire avec
alvéolite hémorragique lobaire
inférieure droite et épanchement
pleural réactionnel








Infarctus pulmonaire
subaigu , remaniements
atélectasiques débutants
et épanchement pleural
réactionnel

Infarctus
pulmonaire
subaigu à
tendance rétractile



Suspicion de lésion tumorale pulmonaire
inférieure gauche : atelectasie de
morphologie nodulaire sur embolie
pulmonaire subaiguë




Critères diagnostiques positifs


Conséquences pleuro-parenchymateuses


Signe de cœur pulmonaire chronique post-embolique ou olighémie de perfusion / perfusion en « mosaïque » :

Images constituées de plages en « verre dépoli » bien limitées touchant un ou plusieurs lobule secondaire de Miller (selon le territoire vasculaire) au sein desquels les artères centro-lobulaires sont dilatées. Les zones apparaissant normales présentent des artères centro-lobulaires de petite taille, et correspondent en fait aux territoires vasculaires amputés ou il existe une vasoconstriction. **Pas de modifications des images en expiration.**





Perfusion en mosaïque typique
Plage en verre dépoli centrée par
ACL dilatée (territoires sains).
Le reste du parenchyme présente
une vasoconstriction (mécanisme
adaptatif)












Perfusion en mosaïque typique
En coupe axiale et frontale






Perfusion en mosaïque discrète et pseudo épaississement
pariétal circonférentiel artériel pulmonaire






Perfusion en mosaïque (cœur pulmonaire chronique post-embolique)
à prédominance **périhilaire**. *Coupes frontales MIP et MinIP*

Perfusion en mosaïque (cœur pulmonaire chronique post-embolique)
Pas de modification du gradient de « verre dépoli » en expiration.



inspi



expi

Critères diagnostiques positifs

Corrélation TDM-Radiographie thoracique




La radiographie thoracique (RT) est le plus souvent normale dans les 24 premières heures.

Dans les jours suivants, la RT peut

- rester normale (12%),
- montrer un foyer de condensation périphérique ou une atélectasie (60%),
- ou un épanchement pleural (23%)

4 signes sont classiquement décrits dans l'embolie pulmonaire

- ✓ Signe de Westermark
- ✓ Signe de Fleischner
- ✓ Signe de Hampton
- ✓ Signe de Zweifel



Signe de Westermark (olighémie zonale)


Signe de Fleischner (AP proéminente)

➔ **Signe d' embolie pulmonaire proximale**

Signe de Hampton (opacité à base pleurale = infarctus)

Signe de Zweifel (ascension diaphragmatique par parésie fonctionnelle liée à une sidération musculaire algique)

→ **Signes d'embolie pulmonaire distale avec infarctus au minimum subaigu**



Critères diagnostiques positifs

Conséquences cardiovasculaires


Signe d'insuffisance cardiaque droite

Retentissement vasculaire veineux d'amont :


Une majoration brutale des volumes ou des pressions cardiaques droites peut retentir sous la forme d'une dilatation vasculaire sur le réseau veineux en amont

→ **Dilatation veineuse juxta cardiaque d'amont** (veine cave supérieure et inférieure, veine azygos, veines sus hépatiques)

→ **Reflux cavo-sus-hépatique** . Ce reflux est également le témoin indirect d'une insuffisance tricuspidiennne, fréquemment observé dans les défaillances du cœur droit et notamment dans les cas de dilatation de l'anneau tricuspideen. Cette valvulopathie participe à la diminution des performances d'éjection du VD



Embolie pulmonaire sans défaillance cardiaque : reflux cavo-sus hépatique sans dilatation de la veine cave supérieure ou de la crosse de l'azygos.



Embolie pulmonaire avec défaillance cardiaque : reflux cavo-sus hépatique et dilatation de la veine cave supérieure ainsi que de la crosse de l'azygos.

Critères diagnostiques positifs

Conséquences cardiovasculaires

Signes d'insuffisance cardiaque droite

Signes congestifs :

Il s'agit des conséquences en particulier viscérales de la majoration brutale des volumes ou des pressions cardiaques droites :

→ **Ascite** libre diffuse, plus rarement **péricardite** et **œdèmes des membres inférieurs**


→ **Foie cardiaque ou congestion hépatique** (pathologie réversible après traitement de la cardiopathie causale) **pouvant conduire à l'insuffisance hépatique**)

La perfusion veineuse du foie est liée à l'existence d'un gradient de pression entre la veine porte et les veines sus-hépatiques. Ce gradient de pression, qui à l'état normal est inférieur à 5 mmHg, détermine la pression de perfusion hépatique. Une augmentation isolée de la pression dans les veines sus-hépatiques s'accompagne d'une diminution de la pression de perfusion hépatique et donc d'une diminution du débit sanguin portal.

En imagerie il existera alors une **hépatomégalie** pouvant être dysmorphique et le **rehaussement** hépatique sera **hétérogène** avec un aspect **typique en mosaïque**.


Macroscopiquement, le foie cardiaque « congestif » est augmenté de volume avec alternance de zones de congestion violacées et de zones non congestives plus claires.

Microscopiquement, il existe une dilatation des veines centrolobulaires, associée à une dilatation et une congestion des sinusoides adjacents. La congestion est caractérisée par l'accumulation d'hématies dans les sinusoides dilatés, des altérations des hépatocytes de la région centrolobulaire et, éventuellement, une atrophie des travées hépatocytaires.







Foie congestif typique d'insuffisance cardiaque droite avec rehaussement hétérogène en mosaïque






Cette congestion peut être associée à une nécrose hépatocytaire prédominant également dans la région centrolobulaire. Lorsque la congestion est prolongée, on peut observer une fibrose développée à partir des régions centrolobulaires. L'extension de la fibrose peut conduire à la constitution de ponts réunissant entre elles les veines centrolobulaires. Occasionnellement, lorsque la congestion est particulièrement prolongée, l'extension de la fibrose peut conduire à la constitution d'une cirrhose avec une fibrose annulaire. Lorsque le foie cardiaque résulte d'une ischémie aiguë isolée, les lésions de congestion sont absentes.



Cœur pulmonaire aigu post embolique et foie congestif typique : rehaussement hétérogène en mosaïque.



Embolie pulmonaire avec insuffisance cardiaque globale :
reflux cavo-sus hépatique, dilatation atriale droite et foie cardiaque
d'origine droite (congestion partielle du foie droit) et gauche
(ischémie artérielle par bas débit du reste du parenchyme).



CPC post-embolique : foie congestif ancien d'aspect dysmorphique cirrhotique. Dilatation atrio-ventriculaire droite et reflux cavo-sus-hépatique

Critères diagnostiques positifs

Conséquences cardiovasculaires



Signes d'insuffisance cardiaque droite

Signes de souffrance ventriculaire droite :


Ils témoignent de la compensation myocardique ventriculaire et de la lutte contre l'obstruction d'aval ou éventuellement de son incapacité à surpasser l'obstacle à l'éjection.

→ **Dilatation atriale et/ou ventriculaire droite.** La dilatation peut être chiffrée par le rapport du diamètre ventriculaire droit sur diamètre ventriculaire gauche : mesure médiocardiaque en regard de la jonction entre les cordages et la valve mitrale sur une coupe axiale native (pathologique si >1) ou en coupes 4 cavités (pathologique si $>0,9$)


→ **dysmorphie septale :** les anomalies septales sont directement liées à une baisse du pouvoir de distension du ventricule gauche (augmentation pressionnelle droite, confinement péricardique). Ainsi convexe vers la cavité droite en temps normal, il peut devenir rectiligne, sigmoïde voire convexe vers le ventricule gauche.




Cœur pulmonaire aigu post embolique : dilatation de la veine cave supérieure, dilatation du VD ($DVD/DVG > 1$), rigidité du septum (perte de la convexité droite) et thrombus atrial droit





Mesure de la dilatation du VD en coupes axiales : rapport des diamètres des 2 ventricules à hauteur de la jonction - cordages valve mitrale : DVD/DVG
rigidité du septum (perte de la convexité droite)





Embolie pulmonaire avec adaptation ventriculaire droite. Aspect normal du septum




Dilatation du VD et rigidité du septum






dilatation du VD et aspect sigmoïde du septum




dilatation du VD et aspect convexe du septum vers le ventricule gauche (examen synchronisé)





Embolie pulmonaire majeure avec défaillance ventriculaire droite : dilatation du VD, aspect convexe du septum vers le ventricule gauche

En cas d'examen synchronisé à l'ECG, le scanner permet d'étudier et de chiffrer la fonction globale des deux ventricules :
→ Par le calcul de la fraction d'éjection (VTD-VTS/VTD) des ventricules droit et gauche
dans certains cas il permet d'apprécier un éventuel trouble de la fonction segmentaire (hypo, akinésie voire dyskinésie).



Volumes télédiastolique et télésystolique en méthode 3D





Contourage (Simpson)

Critères diagnostiques positifs


Conséquences cardiovasculaires

Signes d' HTAP (contexte de CPC post-embolique):


- Dilatation du tronc de l' AP et des artères pulmonaires : un diamètre du tronc de l' artère pulmonaire supérieur à 30 mm indique une pression artérielle pulmonaire supérieure à 20 mmHg.
- En cas d' HTAP chronique : muscularisation du ventricule droit avec une paroi supérieure à 6mm , recrutement de la circulation systémique bronchique.
- +/- signes insuffisance cardiaque (cf précédemment)





Dilatation sévère du tronc de l' artère pulmonaire ainsi qu' atrio-ventriculaire droite et hypertrophie ventriculaire droite



EP chronique :
recrutement de la
circulation bronchique










HTAP secondaire (CPC post-embolique)
muscularisation sévère du ventricule droit



➔ **Ouverture du foramen ovale** : le foramen ovale perméable de haut grade et les communications inter-atriales sont accessibles au diagnostic tomodensitométrique grâce à une acquisition ciné-TDM centrée sur le **septum inter-atrial** : Le monitoring et le timing de rehaussement des cavités gauches par rapport aux cavités droites permet le diagnostic positif.



HTAP primitive débutante : Absence de FOP (pas de shunt G-D)
Pas de rehaussement précoce des cavités gauches pendant les 20-25 premières secondes après l'injection de PdC iodé




FOP grade 4

Pathologie pulmonaire embolique aiguë

Exclusion des diagnostics différentiels


Le scanner permet d'exclure dans la plupart des cas les autres causes de douleur thoracique dans un contexte d'urgence :




Hématome intra-mural de
l'aorte





Pneumopathie
infectieuse




Dissection
aortique



Péricardite aiguë et infarctus du myocarde aigu transmural dans le territoire latéral (examen non synchronisé)



Infarctus ancien antéro-septo-apical sur sténose recanalisée de l'IVA moyenne (examen synchronisé à l'ECG)



Infarctus du myocarde antéro-septo-apical ancien avec thrombus ventriculaire apical latéral (examen non synchronisé)

Sommaire

Diagnostic étiologique


Maladie thrombo-embolique

Le diagnostic étiologique du processus concerne le deuxième versant de la maladie thrombo-embolique : la thrombose veineuse profonde (TVP). A l'heure actuelle ce bilan étiologique est réalisé systématiquement au cours d'un seul et même examen, mais ne concerne que l'étage abdomino-pelvien et les membres inférieurs.



L'acquisition tomодensitométrique à un temps tardif (imagerie de la recirculation veineuse /cf protocole) permet la vérification de toutes les veines y compris les plus profondes et de manière reproductible.

Signe direct de thrombus veineux :

- hypodensité lacunaire intra-vasculaire veineuse
- Le scanner précise l'extension en hauteur, le caractère adhérent ou flottant de la tête du thrombus, son niveau par rapport à la veine cave inférieure, aux veines rénales, l'œdème périvasculaire thrombophlébitique, etc...









Thrombose veineuse profonde
fémorale superficielle droite avec
œdème du membre inférieur








TVP poplitée et des veines
jambières tibiales postérieures
et péronières droites. Kyste
poplité gauche






TVP fémoropoplitée
bilatérale étendue à droite à
la veine iliaque droite


Thrombose veineuse
saphène interne bilatérale






TVP fémorale profonde bilatérale



TVP fémoropopliteée droite



TVP cave inférieure à tête flottante



TVP de la veine gonadique droite






Embolies pulmonaires et paradoxales rénales bilatérales sur thrombose veineuse hypogastrique droite

De plus, le scanner dans la plupart des cas permet de statuer sur certains facteurs de risque de thrombose veineuse :

- ✓ **Contexte carcinologique** +++ (tumeurs viscérales, digestives, genito-urinaires, pulmonaires, adénopathies hémopathiques...)
- ✓ **Contexte inflammatoire** (foyer infectieux viscéral ou ostéo-articulaire profond...)
- ✓ **Compression veineuse pelvienne** (lésions ovariennes...)
- ✓ **Corps étrangers médico-chirurgicaux** (pacemaker, cathéters centraux...)
- ✓ **Traumatisme majeur** (polytraumatisme, fractures multiples...)

Embolie pulmonaire
lobaire inférieure droite
sur thrombose iliaque
droite, révélatrice d'un
cancer sigmoïdien







Les structures veineuses thoraciques, les confluent veineux brachiaux, les veines de provenance céphaliques mais aussi les cavités atrio-ventriculaires droites ne sont pas explorées de manière optimale lors du bilan TDM habituel :


→ un diagnostic de certitude ne saurait être obtenu sur une acquisition à visée artérielle pulmonaire trop précoce pour l'étude veineuse (l'absence d'opacification des axes veineux sous claviculo-brachiaux controlatéraux au site d'injection et des axes jugulaires, le mélange hétérogène du sang iodé provenant de la veine cave supérieure et du sang non iodé issu de la veine cave inférieure complique l'analyse luminale veineuse et cavitaire droite)

→ une acquisition complémentaire tardive thoracique peut être nécessaire afin d'affirmer la présence d'un thrombus cruorique.












Embolie pulmonaire massive bilatérale et thrombus intra-atrial droit authentifié sur une acquisition tardive non artefactée. Dilatation ventriculaire droite (DVD/DVG >1) et rigidité septale




Embolie pulmonaire distale et volumineuse lacune atriale droite adossée à la paroi. Absence de prise de contraste au temps tardif : **thrombus**. Dilatation ventriculaire droite (DVD/DVG >1) et inversion septale débutante




Embolie pulmonaire distale liée à plusieurs thrombus
atriaux sur pacemaker double chambre
reflux cavo-sus-hépatique sans dilatation ventriculaire D





Examen en synchronisation ECG : dysplasie arrhythmogène du ventricule droit évoluée: cardiomyopathie dilatée bi-ventriculaire. Troubles cinétiques pariétaux ventriculaires droits importants avec thrombus intra cavitaire bifocal et embolie sous segmentaire



tardif

Thrombus en migration trans-foraminale : signe direct de foramen ovale perméable (FOP)
 Embolie pulmonaire proximale et embolie paradoxale rénale : signe indirect de FOP
 TVP fémorale G, thrombus intra-ventriculaire droit, dilatation du VD ($DVD/DVG > 1$)

Sommaire


Pièges de l'interprétation

Facteurs patients-dépendants

Artefact de mouvement : fréquence +++

Cause : apnée difficilement tenue, cycle cardiaque, tremblements...

→ hypodensité intra-vasculaire liée au mouvement de la structure porteuse (*volume partiel avec le poumon*), authentifiée par le « signe de la mouette » (« seagull sign ») en fenêtre parenchymateuse



Pièges de l'interprétation

Facteurs patients-dépendants

Rapport signal sur bruit insuffisant : obésité +++

Diminution du contraste entre le thrombus cruorique et l'iode circulant.

Analyse difficile des artères segmentaires et sous segmentaires.

→ La majoration de l'épaisseur de coupe en MPVR ou à l'acquisition augmente le rapport signal sur bruit, au détriment de la sensibilité pour la détection d'embolie





Pièges de l'interprétation

Facteurs patients-dépendants

artefact métallique

Cathétérisme de monitoring artériel pulmonaire, sondes de Pacemaker

Pseudo-embolie pulmonaire par génération d'artefact de durcissement de faisceau retentissant sur la densité vasculaire à distance, ou directement au contact du corps étranger.



Artefact métallique et pacemaker triple chambre. Alternance d'hypodensités et hyperdensités radiaires artefactielles. Pas de thrombose au contact du pacemaker (vide de densité artefactiel)

Pièges de l'interprétation




Facteurs patient-dépendants

Artefact de flux

Mélange hétérogène du sang circulant non opacifié et du produit de contraste iodé à hauteur des bases pulmonaires, à l'origine d'une interruption suspendue du rehaussement vasculaire.

Cet artefact très rare serait lié à l'augmentation du retour veineux cave inférieur et atrio-ventriculaire droit à l'inspiration juste avant le bolus iodé. L'hypodensité intra-vasculaire à contours mal limités.

On retrouve cet artefact typiquement au niveau de l'**atrium droit** (veine cave supérieure iodée et veine cave inférieure non iodée) et au niveau de la **Veine cave inférieure** (veine cave inférieure non iodée et veines rénales iodées)



Artefact de flux et aspect de pseudo-embolie pulmonaire, disparaissant au temps tardif après recirculation. ATCD de dérivation cavo-bi-pulmonaire


Pièges de l'interprétation

Facteurs techniques


fenêtre de visualisation : elle doit être adaptée en fonction des situations :

- fenêtre optimale pour la détection des embolies crurales : **700/100 UH** ou calculé en fonction de la densité d'opacification du tronc de l'AP
(centre : densité moyenne du Tronc de l'AP + 2 déviations standards et amplitude de la moitié de la valeur de centre)

- Fenêtres osseuse (artefact) et parenchymateuse (artefact et pathologie parenchymateuse)



Fenêtre de visualisation adaptée à la recherche d'embolie pulmonaire




Pièges de l'interprétation

Facteurs techniques

Stries artefactielles : artefact de durcissement de faisceau lié à la haute concentration iodée intra veineuse cave supérieure, gênant l'interprétation ou mimant une embolie pulmonaire. L'utilisation d'un bolus salé permet de s'affranchir de cet artefact en lavant l'axe veineux.


Discrètes stries artefactielles en regard de la veine cave supérieure : gêne à l'interprétation des artères pulmonaires péricave supérieures



Pièges de l'interprétation

Facteurs techniques

Artefact de filtre : l'utilisation d'un filtre dur pulmonaire ajusté à l'étude du parenchyme, génère en fenêtre médiastinale une augmentation de la densité des bords du vaisseau avec aspect de pseudo-thrombus





Pièges de l'interprétation

Facteurs techniques

Artefact de volume partiel

constaté en regard des vaisseaux de petit calibre dont l'orientation est parallèle ou légèrement oblique par rapport au plan de coupe natif (lingula, lobe moyen). Cet artefact est directement lié à la résolution spatiale insuffisante dans l'axe des z (moyennage des densités vasculaire et parenchymateuse au sein du même voxel).

Volume partiel sur des artères de 6^{ème} ordre en coupes de 2,5 mm, disparaissant en collimation minimale






Pièges de l'interprétation

Facteurs techniques

Artefact en marche d'escaliers

décalage des contours artériels pulmonaires et alternance de plage hyper et hypodenses . Cet artefact est habituellement lié à un mouvement répétitif retentissant sur la structure artefactée : mouvement respiratoire et/ou cardiaque. Il est majoré en cas de synchronisation ECG et de défaillance de l'algorithme.



Artefacts en marche d'escalier.


Pièges de l'interprétation

Facteurs techniques


Erreur technique

Généralement à l'origine d'une opacification insuffisante des artères pulmonaires d'autant plus qu'il existe physiologiquement une variation de l'atténuation artérielle entre le sommet et les bases pulmonaires liée au gradient ventilation/perfusion.


La reconnaissance des embolies intra-luminales est plus difficile. Dans ce contexte, on retrouve également les embolies pulmonaires de découverte fortuite, pour lesquelles le protocole d'examen n'est pas adapté.



Acquisition trop tardive : mauvais contraste entre l'embolie et la lumière artérielle opacifiée



Découverte fortuite d'une embolie pulmonaire
sur thrombose veineuse profonde fémorale superficielle
droite, dans un contexte de foyer infectieux chronique
rénal gauche : protocole non adapté avec contraste
insuffisant dans les artères pulmonaires.





Pièges de l'interprétation

Facteurs anatomiques

Volume partiel avec des formations ganglionnaires

Notamment avec les loges ganglionnaires périhilaires, interlobaires voire intra-parenchymateuses. L'utilisation d'une collimation minimale millimétrique, de reformations multiplanaires et la connaissance anatomique des sites ganglionnaires permet de distinguer ces structures lymphatiques d'une pathologie embolique aiguë ou chronique (situation extra-luminale, contours vasculaires préservés)




Ganglions périhilaires.

Pièges de l'interprétation

Facteurs anatomiques

bifurcations vasculaires

Ces bifurcations peuvent générer en coupes axiales un defect vasculaire linéaire par volume partiel. Des reconstructions dans le grand axe vasculaire, permettent de récupérer un chenal vasculaire intègre.




Bifurcations vasculaires

Pièges de l'interprétation

Facteurs anatomiques

Confusion entre les artères et les veines pulmonaires :

Les anomalies de remplissage veineux pulmonaire sont très fréquentes (opacification hétérogène ou retardée). Les veines sont reconnues à l'absence de bronche contiguë et grâce au suivi de leur trajet jusqu'à l'atrium gauche.



Pièges de l'interprétation






Facteurs pathologiques

Impactions mucoïdes

La présence de matériel mucoïde intra-bronchique peut simuler une embolie pulmonaire aiguë, notamment en cas d'inflammation pariétale.

La structure anormale est alors en continuité avec les bronches d'amont et il existe une artère normale en position adjacente. Des troubles bronchiolitiques d'aval peuvent être retrouvés.



Impactions mucoïdes bronchiques. Les artères pulmonaires adjacentes sont perméables mais de calibre diminué (vasoconstriction du territoire mal ventilé)



Pièges de l'interprétation

Facteurs pathologiques

œdème périvasculaire : un syndrome peri-bronchovasculaire en particulier en cas d'insuffisance cardiaque gauche peut simuler une embolie pulmonaire chronique. Les signes accompagnateurs évocateurs seraient alors des opacités en verre dépoli, des épaississements des septa interlobulaires ainsi que des épanchements pleuraux.



Syndrôme péri-broncho-vasculaire : pseudo épaississement pariétal artériel, contexte d'insuffisance cardiaque gauche

Pièges de l'interprétation


Facteurs pathologiques

Augmentation des résistances pulmonaires

la plupart des pathologies pulmonaires peuvent être à l'origine d'une augmentation des pressions pulmonaires et donc d'une résistance à l'écoulement sanguin se traduisant par une hypo-opacification du territoire concerné.

- obstruction pariétale extrinsèque ou intra-luminale
- augmentation des pressions veineuses
- atélectasie ou foyer de comblement alvéolaire
- HTAP primitive ou secondaire
- destruction parenchymateuse (BPCO)

Augmentation localisée des résistances pulmonaires en amont d'un foyer pleuro-parenchymateux infectieux



Pièges de l'interprétation

Facteurs pathologiques

Images en« verre dépoli » d'origine obstructive ou pathologique infiltrante


L'olighémie en mosaïque n'est pas la seule cause d'hétérogénéité parenchymateuse pulmonaire.

→ Deux autres groupes pathologiques doivent être discutés :

- Les pathologies obstructives avec piégeage d'air en sont la cause la plus fréquente (bronchiolite oblitérante, bronchectasies, obstruction bronchique...)
- Les pathologies « interstitielles » infiltrantes (œdème pulmonaire, protéinose alvéolaire, pneumopathie d'hypersensibilité, etc...)

Pathologies	Calibre de l' ACL	Trapping
Voies aériennes	N ou ↗	Présent
Vasculaires	↗	Absent
Infiltrantes	N	Absent


INSP



EXP




Bronchiolite oblitérante




Le piégeage focal d'air lors de pathologie obstructives se traduit également par des plages en « verre dépoli », ces dernières correspondant aux zones pulmonaires bien aérées.

Deux critères doivent être recherchés : la majoration du gradient en expiration et la réduction du lit capillaire (pauvreté de perfusion des zones peu ventilées par vasoconstriction : l'artère apparaîtra de plus grand calibre dans les zones en verre dépoli)



Bronchiectasies avec troubles ventilatoires d'aval



Maladie veino-occlusive



Poumon éosinophilique

La pathologie infiltrante pulmonaire regroupe de multiples processus différents. Les images en « verre dépoli » sont alors le témoin d'une réduction de la quantité d'air intra-alvéolaire soit par remplissage alvéolaire partiel des espaces aériens par un matériel tissulaire ou liquidien par exemple (un remplissage total donnerait un comblement alvéolaire), soit d'une atteinte interstitielle pure par épaississement des septa intralobulaires, soit des deux simultanément.

D'autres éléments sémiologiques (consolidation parenchymateuse, nodules, épaississement des septas inter-lobulaires, kystes) permettent d'orienter vers une étiologie précise

Pneumopathie d'hypersensibilité






Pièges de l'interprétation


Facteurs pathologiques

Angiosarcome de l'artère pulmonaire : cause rare d'obstruction vasculaire pulmonaire . Cette tumeur touche autant les hommes que les femmes de 40-50 ans. Son tableau clinique est semblable à l'embolie pulmonaire, mais ne disparaît pas sous TTT anticoagulant.



Elle est souvent unilatérale, lobulée et rehaussée de manière hétérogène plutôt tardivement. Le vaisseau porteur est souvent distendu. Tendance à l'extension le long des axes vasculaires artériels et transmurale vers le hile, le médiastin, le parenchyme pulmonaire ou le péricarde

Embolie pulmonaire
résistant au
traitement
anticoagulant :
hypersignal
tissulaire en IRM





Sarcome de l'artère pulmonaire :
prise de contraste tumorale et signe
de Westermark




Pièges de l'interprétation





Facteurs pathologiques

Les emboles tumorales :







- se manifestent le plus souvent par une embolie périphérique sous segmentaire avec dyspnée progressive et HTAP subaiguë.
- Plus rarement le tableau est celui d'une embolie proximale, lobaire ou segmentaire (envahissement cave inférieur de carcinome hépato-celulaire, d'adénocarcinome rénal ou de choriocarcinome).
- Il existe dans la plupart des cas une participation fibrino-cruorique organisée. Le contingent tumoral reste d'identification difficile; elle réside sur la constatation d'une cinétique de rehaussement similaire à la lésion primitive ou son extension veineuse.
- A noter le cas particulier des micro-embolies (cancer de prostate ou de sein, et moins fréquemment carcinome hépato-celulaire, gastrique et pancréatique) : la sémiologie liée à une atteinte des artérioles du lobule secondaire est de type arbre à bourgeon.







Embolie tumorale sur tumeur de Grawitz bilatérale. Envahissement cave inférieur avec coiffe thrombotique crurorique . Prise de contraste de l' embole de l' artère pulmonaire droite



Embolie basale cruorique sur
tumeur de Grawitz droite.
Envahissement cave inférieur
avec coiffe thrombotique
cruorique .



Embolie basale crurique droite sur
carcinome hépatocellulaire
envahissant la veine sus hépatique
droite, la VCI et le tronc porte.



Embolie tumorale sur CHC fibrolamellaire.

Sommaire