






Patiente de 70 ans Douleurs abdominales brutales avec défense de la fosse iliaque droite et de l' hypogastre Nausées sans arrêt des matières et des gaz
ATCD de gastrectomie pour lymphome

quels sont les éléments sémiologiques significatifs à retenir sur ces coupes scanographiques sans puis avec injection de produit de contraste




Sybille Duroch IHN





il existe bien un syndrome occlusif du grêle ,intéressant le jéjunum et la majeure partie de l'iléon

une image attire l'attention à la partie haute du pelvis ; elle parait se situer dans le segment intermédiaire , entre le grêle distendu et l'iléon terminal plat





les reformations coronale et sagittale n'apportent guère de données significatives


par contre l'analyse de l'image pelvienne postérieure avec l' "œil densitométrique" doit nous mettre sur la voie .pourquoi



la densité de la zone centrale de l'image est identique à celle du gaz des anses grêles distendues .

alentour on voit une sorte de capsule d'épaisseur régulière et de structure homogène , spontanément hyperdense , ne se rehaussant pas après injection et entourée de la paroi intestinale , donc l'anomalie observée est de siège endoluminal .





le chirurgien lève le mystère en
extrayant ce corps étranger dégluti
qui n'est autre qu'un abricot séché ,
avalé sans avoir été mâché
distraction ? édentation ?

occlusion sur abricot
séché dégluti non mâché



An unusual cause of small bowel obstruction: dried apricots

Metehan Gümüş,¹ Murat Kapan,² Akin Önder,³ Güven Tekbas,⁴ Yusuf Yagmur⁵

Department of General Surgery,^{1-3,5} Department of Radiodiagnostic,⁴ Dicle University, Faculty of Medicine, Turkey.

Conclusion

Dried apricot could cause intestinal obstruction when swallowed especially in edentulous patients. Apricot obstruction should also be considered in the diagnosis of bowel obstruction although it is a very rare case.

<http://www.jpma.org.pk/PdfDownload/3118.pdf>



Figure: (A) Natural and dried apricot. (B) Swollen apricot which was the cause of obstruction. (C) Unchewed apricot removed from the obstructed segment of the bowel. (D) Chewed apricot which were removed from the bowel of the patient and did not cause obstruction.

messages à retenir

- parmi les causes rares d'occlusion du grêle, il faut penser aux **corps étrangers alimentaires déglutis**, en particulier chez les sujets édentés, les sujets âgés ayant des troubles de la mastication et / ou de la déglutition d'origine neurologique etc. , mais aussi chez les enfants.
- les corps étrangers **végétaux** et en particulier **les fruits** ou **légumes SECS** , , les graines de semence etc. exposent plus particulièrement à ces occlusions par impaction du grêle car ils se distendent progressivement par absorption d'eau.
- généralement l'obstruction (impaction) se situe au niveau de l'iléon terminal
- le diagnostic étant souvent retardé, il existe fréquemment des **troubles ischémiques liés à la compression pariétale par le phytobezoard** qui imposent une résection intestinale segmentaire.