

Volumineuse masse abdominale palpable , révélée par des épisodes douloureux subaigus itératifs cédant spontanément , chez une femme de 42 ans , sans antécédents

hypothèses diagnostiques




foie : CHC , métastase ...


Intestin mésentère : GIST , T desmoïde

gynéco : volumineux myome , sarcome utérin

....

What else ?








Ces deux images pourraient (devraient) vous aider !




Cette fois , le doute n'est plus permis ! Diagnostic




Rate baladeuse ou
wandering spleen ou
encore pelvic spleen




Suivez l'artère splénique et le
pancréas caudal qui
l'accompagne jusqu'au hile de
la rate !






Veine splénique



Artère splénique







La rate « baladeuse » ou rate « voyageuse » est une entité rare . Il s'agit d' une rate localisée en dehors du quadrant supérieur gauche de l' abdomen par défaut des moyens de fixité anatomique avec les organes avoisinants et/ou hyper laxité des ligaments gastro-splénique et spléno-rénal
Elle expose à des complications aiguës ischémiques (infarctus splénique) ou au développement d'une HT portale segmentaire du territoire splénique avec possibles hémorragies digestives sur varices gastriques

≈ 500 cas décrits dans la littérature


2 pics de fréquence :

- . chez l'enfant +++ association avec Marfan/ Ehler-Danlos
- . chez la femme en âge de procréer

Complications observées dans 65 % des cas de rate baladeuses surveillées , donc indication opératoire formelle : splénopexie de préférence à splénectomie (sauf si infarctus splénique)



femme 56 ans ; sd douloureux aigu abdominal ; masse palpable sensible de l'hypogastre ; ischémie splénique (défaut de rehaussement) , sans infarctus constitué



**rate baladeuse "comme autrefois" !
avant l'imagerie en coupes**