


Patient de 41 ans


Douleurs abdominales chroniques et **rectorragies**

Examen clinique : sans particularité


TDM abdomino pelvien

SCANNER ABDOMINO PELVIEN





Diagnostic (s)



Volumineuse **tumeur intra luminale colique gauche**

57 x 41 x 59 mm

Composante **graisseuse**

Pas d'extension loco régionale


Révélee par des rectorragies

Décision : **coloscopie**

Préparation PEG → **DOULEUR ABDOMINALE** et **MASSE**
de la fosse iliaque gauche à la palpation




COLOSCOPIE



Pas de lésion du rectum ni du bas sigmoïde.

A 80 cm : volumineuse **tumeur hypervascularisée**, à pédicule large et charnu.


COLOSCOPIE



En amont, important **œdème** de la muqueuse colique (aspect "succulent"), aspect **vrillé** de la lumière, **sténose** difficilement franchissable

Poussée aiguë sur invagination intestinale chronique colo colique gauche !
Partiellement réduite au retrait de l'endoscope

COELIOSCOPIE EXPLORATRICE / LAPAROTOMIE



Dans un 1^{er} temps : coelioscopie exploratrice
Côlon gauche dilaté, fixé, de mobilisation difficile
Conversion en courte laparotomie sous ombilicale
Colotomie en regard de la lésion tumorale

COELIOSCOPIE EXPLORATRICE / LAPAROTOMIE



Extériorisation de lésion lipomateuse, zone d'implantation sous angulaire gauche

Exérèse totale, avec le revêtement muqueux, partiellement ulcéré

Fermeture

Désinvagination

ANATOMO PATHOLOGIE

Pièce d'exérèse de contours réguliers
78 x 54 x 50 mm

Macroscopie : aspect **homogène**,
lipomateux, sans zone nécrotique ou
hémorragique

Histologie

Adipocytes matures



Pas d'atypie

Pas d'activité mitotique

Fibrose périphérique

Vaisseaux à parois légèrement épaissies

→ Lipome sans signe de malignité




INVAGINATION INTESTINALE COLIQUE chronique de l'adulte

Rare


80% ces cas : cause organique

- adénocarcinome de la valvule de Bauhin ++
- +
- lipome
- mucocèle appendiculaire
- LMNH (Burkitt)
- polypose hamartomateuse de Peuts Jeghers Touraine
- polypose inflammatoire pseudo-tumorale des MICI
- métastase (mélanome)

Révélation des lipomes par des rectorragies fréquente (nécrose ischémique du lipome)





ADK valvule de Bauhin



Peutz-Jeghers
polype hamartomateux



Mucocèle appendiculaire



lipome