









jeune femme 27 ans ,douleurs abdominales et constipation sévère de puis plusieurs mois ;  
sténose serrée infranchissable de la charnière recto-sigmoïdienne à la sigmoïdoscopie ;  
muqueuse saine dans les endroits accessibles






endométriose pelvienne profonde





endométriose pelvienne profonde; endométriomes ovariens





reformations  
"courbes"



endométriose pelvienne profonde , "cancer  
bénin !! " ; endométriome ovarien +++



scanner du thorax le même jour  
que le colo scanner à l'eau !



endométriose pelvienne profonde avec  
endométriome ovarien et  
pneumothorax spontanés récidivants  
(cataméniaux) par endométriose juxta  
pleurale




endométriose sigmoïdienne typique




obs. JM Barc Vannes










endométriose sigmoïdienne typique




versant séreux






endométriose  
sigmoïdienne  
typique



obs. JM Barc Vannes










coloscopie virtuelle ; "rendu de volume ; VRT)





**nodule pariétal sigmoïdien sans ulcération muqueuse** ; sténose courte à muqueuse saine (défaut d'expansion permanent et enraidissement des contours )

**spiculations des bords** = atteinte "extrinsèque" à composante fibreuse rétractile







endométriose  
sigmoïdienne  
bilobée



endométriose pelvienne  
profonde avec atteinte  
sigmoïdienne












rétraction et fixité des segments digestifs atteints : trajet "en baïonnette" de la charnière recto-sigmoïdienne; extension à l'iléon terminal

douleurs pelviennes depuis plus de 10 ans résistantes à une prise en charge psychiatrique ... , endométriose pelvienne profonde



jeune femme 35 ans , constipation chronique , douleurs abdomino-pelviennes  
chroniques ...dyspareunie , hypofertilité



occlusion chronique du grêle



occlusion chronique du grêle par endométriose  
pelvienne profonde étendue au carrefour iléo-caecal





## take home message

- l'endométriose pelvienne profonde se manifeste essentiellement par un nodule fibreux développé dans la paroi du sigmoïde , sous une muqueuse saine
- le site de prédilection est la face antérieure de la charnière recto-sigmoïdienne
- la rétraction et la fixité sont des caractères morphologiques essentiels pour le diagnostic
- l'intégrité de la muqueuse explique l'inefficacité de l'endoscopie recto-sigmoïdienne pour le diagnostic ,
- l'association de lésions ovariennes (endométriomes) est précieuse pour le diagnostic par l'imagerie

