



Femme de 36 ans ; neurofibromatose de type I (maladie de von Recklinghausen)
 Iléite aigue diagnostiquée en juillet 2007 malgré une absence de lésion épithéliales à l'endoscopie ...
 le scanner abdominal pratiqué en 2009 puis 2011 , à la suite d'épisodes subocclusifs répétés,
 montre les aspects suivants sur lequel le diagnostic de maladie de Crohn est porté...Quels sont les
 arguments sémiologiques pour et contre ce diagnostic :



on observe effectivement :

- .un épaississement pariétal circonférentiel régulier segmentaire sur des anses iléales distales
- .une distension liquide segmentaire du grêle d'amont
- .un aspect de prolifération fibro-graisseuse du mésentère correspondant au segment intestinal anormal



mais ! :

.l'aspect du mésentère anormal est très particulier : semis de "micronodules" millimétriques , ne correspondant pas à des vaisseaux

.l'épaississement des parois est de densité "tissulaire" ,d'aspect polypöide

.le rehaussement de la muqueuse est normal , très régulier

.il n'y a aucun signe d'atteinte inflammatoire transmurale : pas de spiculations du versant mésentérique des parois anormales des anses ; pas de "vrai" signe du peigne



l'entéroCT montre
clairement

.la localisation des **lésions
polypoïdes en nappes**
prédominant sur la partie
mésentérique de la
circonférence pariétale

.le caractère multisegmentaire
de l'atteinte pariétale

.l'absence de tout signe
d'inflammation transmurale




Février 2011 : entéroscopie par voie basse : zone inflammatoire et ulcérée étendue sur 20 cm, en amont de la dernière anse iléale ; pas de signe en faveur d'une maladie de Crohn .

Les biopsies font enfin le diagnostic , après plus de 2 ans d'évolution et de surveillance (2 scanners , 2 endoscopies , pour une atteinte dont le diagnostic est évident sur l'imagerie en coupes , si l'on tient compte du contexte clinique)

L'accumulation des examens complémentaires ne pallie pas les carences intellectuelles ; le caractère "opérateur-dépendant" concerne tout acte diagnostique médical en général et radiologique (et pas seulement échographique !) en particulier , il doit être compris comme dépendant des connaissances de celui ou celle qui lit les images (et non de leur habileté manuelle ou de l'acuité de leur vision)


"il faut d'abord savoir ce que l'on cherche et donc d'abord chercher ce que l'on doit chercher ..."






on retrouve dans le mésentère
les multiples néoformations
millimétriques hypervascularisées
et la prolifération graisseuse

sur le versant séreux de la
paroi intestinale quelques
éléments nodulaires plus
volumineux sont présents



sur le versant endoluminal les
nodules prédominent du côté du
mésentère ; la muqueuse est
inflammatoire sans ulcérations








l'étude microscopique montre des zones de tumeurs à cellules fusiformes histologiquement bénignes, d'architecture neuroïde, infiltrant toute la paroi, y compris la lamina propria de la muqueuse et la séreuse.

le diagnostic est donc celui de **ganglioneuromatose intestino-mésentérique** dans ce contexte de neurofibromatose de type 1



cellules ganglionnaires matures dispersées dans des nappes de cellules fusiformes schwanniennes



la ganglioneuromatose intestinale (intestino-mésentérique)


Affection rare et bénigne caractérisée par une prolifération néoplasique de cellules ganglionnaires matures, de cellules de Schwann et de fibres nerveuses dans la paroi de l'intestin (plexus myentériques et fibres nerveuses entériques).

Fréquemment associée à une **MEN type 2 b** (phéochromocytomes bilatéraux et paragangliomes, carcinome médullaire de la thyroïde, morphotype marfanoïde, neuromes muqueux et bucaux (blueberry lips). Syndrome de Gorlin 1968) et moins fréquemment à une **neurofibromatose (NFM) type 1**

La ganglioneuromatose est également fréquemment associée avec la **maladie de Cowden** (hamartomes diffus du tractus intestinal : ganglioneuromes, lipomes, adénomes ; acanthosis glyogénique de l'œsophage).

Peut toucher n'importe quelle portion de l'intestin (colon et iléon ++); le grêle est plus souvent atteint dans la MEN 2b, tandis que le colon l'est dans la NFM type 1.

L'infiltration tumorale est limitée à la sous muqueuse ou transmurale, elle touche la lamina propria dans la NFM type 1. Elle peut revêtir 3 grands aspects macroscopiques : **polypeuse localisée (ganglioneurome solitaire)**, **polypoïde segmentaire en nappe (ganglioneuromatosis polyposis)** ou **diffuse (ganglioneuromatosis)**.



Levy AD et al. *RadioGraphics* 2005; 25:455-480 . Published online 10.1148/rq.252045176

POIC et nvagination révélant une ganglioneuromatose dans une NFM 1



*ganglioneuromatose
simulant une
maladie de Crohn*

Quand une forme diffuse atteint la dernière anse iléale, il peut y avoir un épaississement de la paroi, une prolifération nodulaire sous muqueuse, des sténoses et un tableau clinique de douleurs abdominales et diarrhée, ce qui mime une maladie de Crohn

la présentation clinique la plus fréquente de la ganglioneuromatose intestinale se fait le plus souvent sous forme de douleurs abdominales avec diarrhées ou d'un **syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC)** ; le diagnostic est toujours très tardif, souvent après chirurgie de résection intestinale pour syndrome occlusif, comme dans le cas rapporté. La ganglioneuromatose peut être **secrétante (VIP)** et à l'origine d'une diarrhée cholériforme

D'autres **diagnostics différentiels** doivent être discutés : atteinte ischémique chronique, post-radique, CMV, GVH, lymphome, amylose...

Traitement : résection chirurgicale en raison de la mauvaise réponse au traitement médical, en particulier dans les formes subocclusives



classification des tumeurs abdominales rencontrées dans la neurofibromatose de type 1

Levy AD et al.
RadioGraphics 2005;
25:455-480 . Published
online 10.1148/rp.
252045176

Neurogenic neoplasms

- Neurofibroma

- Plexiform neurofibroma

- Malignant peripheral nerve sheath tumor

- Triton tumor

- Ganglioneuroma

Neuroendocrine neoplasms

- Carcinoid

- Pheochromocytoma

- Paraganglioma

- Gangliocytic paraganglioma

Nonneurogenic gastrointestinal mesenchymal neoplasms

- Gastrointestinal stromal tumor

- Leiomyoma

- Leiomyosarcoma

Embryonal tumors

- Rhabdomyosarcoma

- Neuroblastoma


- Wilms tumor

Miscellaneous tumors

- Gastrointestinal adenocarcinoma

- Pancreatic adenocarcinoma

- Biliary adenocarcinoma



les atteintes abdominales sont très variées au cours de la NFM 1 .

n'oubliez pas de regarder les parois abdominales avec un fenêtrage adapté à l'exploration de la peau pour découvrir le détail (neurofibrome) qui vous donnera l'accès au podium car **il n'y a pas un concours diagnostique en radiologie sans NFM 1 !**

messages à retenir

-les

et les

tumeurs stromales gastro-

intestinofibromes profonds plexiformes mésentériques

étant

la plus fréquente

Planchon, P. 1954. Les ganglions lymphatiques du rat (Séminaire de la faculté de médecine de la Sorbonne, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2

pressurisés à l'acide chlorhydrique et / ou diarrhéique , il ne faut pas

par un examen soigneux des images des parois au scanner
(l'examen clinique n'étant pas, en règle générale le point fort des radiologues ...malgré leurs

-la NFM type 1 peut-être révélée par l'atteinte digestive . Devant des anomalies pariétales intestinales dans un contexte douloureux subocclusif et / ou diarrhéique , il ne faut pas penser qu'à la maladie de Crohn ! et savoir :

analyser soigneusement les atteintes de la paroi et du mésentère avoisinant pour savoir s'il existe ou non des signes d'atteinte inflammatoire transmurale

traquer les neurofibromes cutanés par un examen soigneux des images des parois au scanner (l'examen clinique n'étant pas , en règle générale le point fort des radiologues ...malgré leurs affirmations incantatoires à ce sujet ...)