


homme 53 ans ; antécédents de chirurgie cardiaque (prothèse valvulaire) radiographie (cardio)thoracique de surveillance

à quoi correspondent ces 2 images




2 structures symétriques par rapport au rachis


seuls les bords supérieurs sont visibles

les limites sont visibles tout en de projetant sur le cœur ; mais le "signe de la silhouette" de B. Felson ne s'applique que si la structure est de densité liquide (tissus mous) ; s'il s'agit de graisse (et a fortiori de gaz ou de tissu calcifié) ce signe ne s'applique pas !!!



a priori , et malgré ces réserves , on peut penser que ces images sont postérieures (rétro cardiaques) , para rachidiennes , et "plongent" dans le rétropéritoine puisque leur contour inférieur n'est pas visible





le scanner va préciser les choses






les 2 structures symétriques par rapport au rachis sont constituées de graisse et coexistent avec de multiples discontinuités dans les régions postérieures des hémicoupoles diaphragmatiques



les h mi couples diaphragmatiques
retrouvent leur aspect normal   la
partie basse





ces formes mineures de hernie diaphragmatique postérieures ou postéro-latérales (Hernies de Bochdalek) de l'adulte sont extrêmement fréquentes (5 à 10 % des patients) et généralement observées chez des sujets pléthoriques . leur incidence augmente avec l'âge, suggérant qu'elles sont acquises. Elles sont rares avant 40 ans , et sont vues chez 5 % des patients entre 40 et 49 ans , 15 % des patients entre 50 et 69 ans , 35 % des patients plus âgés siégeant préférentiellement du côté gauche .

Elles sont pratiquement toujours asymptomatiques , à l'inverse de ce qui est observé chez l'enfant ; même lorsque leur volume augmente dans le temps

take home message

les formes mineures de hernies diaphragmatiques postérieures de l'adulte sont extrêmement banales , surtout chez les sujets âgés , pléthoriques . Elles sont asymptomatiques et s'observent chez 35 % des patients de plus de 70 ans (comme leurs homologues antérieures , les hernies de la fente de Larrey ou hernies de Morgagni , toutefois nettement plus rares).

des formes congénitales de hernie de Bochdalek peuvent être découvertes à l'âge adulte par l'imagerie (en particulier **ectopie haute du rein gauche**) ou à l'occasion de complications

chez l'adulte le contenu de la hernie est pratiquement toujours de la graisse identique à la graisse péri rénale . Exceptionnellement , on peut trouver le rein et plus rarement encore des viscères creux (estomac , grêle).

