








jeune garçon 17 ans , vomissements importants soulageant des crises douloureuses
abdominales survenues depuis 36 heures

quels sont les éléments sémiologiques significatifs à retenir pour le diagnostic






les éléments d'une **occlusion de haut-grade du grêle** sont présents :



- .dilatation majeure des anses jéjunales hautes , du duodénum et de l'estomac
- .anses iléales et jéjunales moyennes et basses plates

il faut donc chercher la zone transitionnelle entre le syndrome sus lésionnel et le syndrome sous lésionnel



chacun d'entre vous a vu cette image endoluminale insolite , dans la zone transitionnelle ; de quoi s'agit-il ; diverticule de Meckel inversé , diverticule endoluminal , volumineux polype hamartomateux (âge : 17 ans) ,duplication intestinale what else





avec la reformation frontale , les doutes s'effacent ;
il s'agit bien d'une tétine , car ce grand garçon
encéphalopathe et surprotégé par sa famille n'avait
pas encore abandonné le vert paradis des amours
enfantines ...

messages à retenir

- les occlusions sur corps étranger dégluti sont habituellement la conséquence de plaies pariétales de l'intestin causées par les parties piquantes et /ou tranchantes de ce corps étranger génératrices d'une péritonite localisée à l'origine d'adhérences intestino-mésentériques
- les occlusions du grêle par obstruction endoluminale sont pour la plupart provoquées par un ou plusieurs volumineux calculs biliaires vésiculaires ayant migré dans l'intestin à la faveur d'une fistule cholécysto-digestive compliquant une cholécystite chronique (iléus biliaire , première cause d'occlusion du grêle chez les femmes âgées de plus de 70 ans)
- parmi les autres causes d'obstacle endoluminal les coprolithes (ou stercolithes mais cette dénomination mélange des racines grecques et latines ...) qui peuvent naître dans tous les diverticules de grande taille (diverticules duodénaux , diverticule de Meckel géant , duplications communicantes) ou en amont de sténoses chroniques serrées du grêle (inflammatoires , ischémiques , post chirurgicales...)
- les occlusions du grêle par obstruction sur corps étranger dégluti supposent soit (ingestion d'un volumineux élément non dégradable : noyau de gros fruit (pêche , abricot , nectarine ..ou tétine de biberon), soit l'ingestion répétée au long cours de cheveux mais parfois de poils du "nounours" (trichobezoard) ...de végétaux cellulosiques (phytobezoard) ..