

le péritoine et les 4 i (inflammation , infiltration , infection , ischémie...) bases sémiologiques




péritoine pariétal





MDCT avant injection)




grand omentum






mésentère







MDCT 70 s




collections péri viscérales (péri spléniques)








œdème , infiltration , collections inter-anses du mésentère




œdème inflammatoire du grand omentum(≠ l' "omental cake" tumoral)










MDCT 70 s







Les reformations multiplanaires sont essentielles pour **évaluer avec précision la diffusion** de la péritonite et des collections (siège, taille, accessibilité à un drainage transpariétal..)






péritonite d'origine gynécologique compliquant une salpingite aiguë

femme 32 ans ; douleurs abdominales , fièvre et diarrhée traitées de puis 3 jours
(diagnostic de gastro-entérite) ; apparition d'un syndrome occlusif



péritonite appendiculaire : signes inflammatoires (misty mesentery , œdème du grand omentum , collections interanses ...) sont trouvées à distance de la région caeco-appendiculaire




diagnostic






péritonite dermoïde: présence de 2
tératomes ovariens matures (flèches bleues)
dont l'un récemment rompu, à l'origine d'un
tableau aigu révélant la péritonite dermoïde

femme 39 ans ;douleurs
abdominales aiguës à début brutal
48 heures avant l'examen



femme 58 ans douleurs abdominales atypique; troubles fonctionnels intestinaux)




diagnostic ?

l'ASP ,l'échographie puis le scanner montrent la lésion calcifiée à contenu graisseux du GO (flèche rouge) ;

l'exploration de la cavité pelvienne confirme la présence de tératomes ovariens matures ,d'aspect analogue (flèches bleues)

et d'autres localisations du même type dans toute la cavité péritonéale (flèches vertes)


détail de l'étage sus mésocolique chez la même patiente ; on retrouve des formations kystiques de la loge sous phrénique gauche





mais surtout des images paraissant intra hépatiques et de densité franchement graisseuse (< -100 UH)

ces lésions sont en fait inter hépato-diaphragmatiques

tératome mature parasitique multifocal sous et sus diaphragmatique , d'origine ovarienne



tératome mature parasitique du GO d'origine ovarienne





femme 67ans ;baisse de l'état général , masse palpable de l'hypochondre droit :

volumineux tératome ovarien mature



lésion parasitique pariétale antérieure siégeant dans le GO

autre lésion parasitique sur le péritoine viscéral hépatique , en situation inter hépato-diaphragmatique.




femme 36 ans ; opérée antérieurement d'un " kyste de l'ovaire "






plusieurs années après



obs. M P Vuillerme Hopital Beaujon






obs. M P Vuillerme Hopital Beaujon





localisations péri hépatiques d'un tératome mature parasitique d'origine ovarienne

médecin africain , 40 ans ,en France depuis 6 mois , VIH -



tuberculose péritonéale







diagnostic



- le péritoine pariétal est épaissi de façon diffuse et régulière
- le "tethered bowel sign" est présent
- il y a du liquide dans la cavité omentale
- le grand omentum est hypertrophié et "oedémateux"

homme 38 ans , syndrome douloureux épigastrique pseudo-ulcéreux de survenue brutale, **arthralgies** , **fièvre** , **syndrome inflammatoire biologique** ; diagnostic



purpura rhumatoïde
(Schönlein-Henoch)

patiente de 20 ans. ; douleurs fébriles fosse iliaque droite ; appendicectomie . Dans les suites apparition des manifestations cutanées avec arthralgies , syndrome inflammatoire biologique , puis syndrome abdominal aigu "chirurgical"



principaux éléments
sémiologiques radiologiques



-épanchement liquide de la cavité
péritonéale (cul de sac de Douglas)

-atteinte inflammatoire aiguë
diffuse et homogène de l'intestin
grêle et du tractus gastroduodéal





diagnostic






vascularite et , compte tenu du contexte
clinique et biologique : entérite lupique

homme 32 ans , syndrome douloureux abdominal aigu fébrile ; héroïnomane



vascularite à l'héroïne



femme de 46 ans d'origine arménienne .Douleurs abdominales/ HCD et **fièvre**
 Discrète cholestase et cytolyse hépatique Suspicion de cholécystite aiguë. Episodes du même type
 dans les antécédents : fièvre , arthralgies , crises douloureuses abdominales et thoraciques



- infiltration diffuse et homogène du mésentère et du grand omentum
- épaississement et prise de contraste du péritoine pariétal
- épanchement liquide de la cavité péritonéale (cul de sac de Douglas)

quels sont les principaux éléments sémiologiques





quelles sont vos suggestions diagnostiques



maladie périodique , fièvre méditerranéenne familiale

la notion d'antécédents de crises douloureuses abdominales et thoracique fébriles , d'arthralgies , de lésions cutanées (érythème douloureux des membres inférieurs

le caractère familial (de - en - fréquent du fait de la transmission récessive et de la diminution de la taille des familles) , l'origine ethnique

l'évolution vers une amylose rénale AA

constituent les principaux arguments pour évoquer le diagnostic et le confirmer par la mise en évidence de la mutation du gène MEFV codant pour la pyridine / marenostriane



homme 38 ans ,HIV+ , fièvre et douleurs abdominales ,baisse de l'état général,
CD4<50/mm³



adénopathies mésentériques à centre hypodense (après contraste)
adénopathies rétropéritonéales
épaississement des valvules conniventes jéjunales
épanchement péritonéal liquide



11 01 2008




11 01 2008



04 07 2008




17 03 2009



entérite à mycobactéries atypiques (MAC)




évolution nécrosante des adénopathies
 $CD 4 < 50/mm^3$

jeune homme de 25 ans , marocain ,sans antécédents pathologiques particuliers
présente de façon brutale un syndrome occlusif.



obs. : Nabil Chikhaoui Casablanca






hernie interne (para duodénale antérieure gauche ;
transmésentérique)

hypothèses
diagnostiques




péritonite sclérosante encapsulante (abdominal cocoon)



abdominal cocoon (sclerosing encapsulating peritonitis)



- englobement par une **nappe fibro-collagène** d'une longueur variable d'intestin (grêle , sigmoïde ..)
- généralement révélé par un épisode occlusif souvent précédé de crises analogues durant plusieurs années
- le grand omentum est souvent de taille réduite , englobé dans la nappe fibreuse
- décrit en 1978 par Foo et coll.



jeune femme 34 ans , sans antécédents .

"cauliflower sign ".



jeune femme 47 ans , sans antécédents .

Facteurs favorisants incriminés :

- chirurgie abdominale antérieure
- dialyse péritonéale chronique
- utilisation prolongée de bêtabloquants (practolol)


...

Traits caractéristiques en CT (Wig et Gupta)




- regroupement de la presque totalité des anses grêles au centre de l'abdomen
- présence d'un "sac" en forme de membrane fine

Histologiquement la membrane est constituée de tissu fibro-collagène avec ou sans foyers inflammatoires

homme , 43 ans. cirrhose éthylique, triple dérivations
bilio-pancréatique . Multiples chirurgies abdominales.
Bilan pré-op pour jéjunostomie.



abdominal cocoon
(sclerosing encapsulating
peritonitis)






jeune fille de 16 ans ,sénégalaise, ; pas d'antécédents particulier.
; syndrome sub occlusif résolutif évoluant depuis 2 - 3 mois; AEG modéré avec amaigrissement.; apyrétique. bilan biologique normal.



abdominal cocoon
(sclerosing encapsulating
peritonitis)

obs. ; Ababacar Mbengue Dakar







dialyse péritonéale
calcifications

péritonites encapsulantes ; "abdominal cocoons"



femme 37 ans, diabète de type 1 dialyse péritonéale depuis plusieurs années





01 2006



01 2007





02 2007



péritonite **encapsulante** (abdominal cocoon)
compliquée d'une perforation de l'iléon terminal

homme 57ans , douleurs abdominales atypiques ,
pas de signes généraux , biologie sans particularités




- hyperdensité de la graisse mésentérique
- effet de masse
- nodules
- fat ring sign
- pseudo capsule fibreuse

pancréas normal
pas d' adénopathies
coeliaques ni
rétropéritonéales

panniculite mésentérique

Femme de 55 ans, asymptomatique. Scanner de surveillance annuelle pour ça ...
femme de 55 ans, asymptomatique. Scanner de surveillance annuelle pour ça ...








diagnostic ?

panniculite mésentérique , bien sur , mais
encore ...qu'est ce que c'est ? , qu'est ce qu'on en
fait ? qui connaît la (les) réponse(s)

panniculite mésentérique : définition et concept classique

- processus inflammatoire chronique du tissu adipeux du mésentère
- physiopathologie mal connue
- non spécifique
- 3 stades évolutifs:
 - lipodystrophie
 - panniculite mésentérique
 - mésentérite sclérosante/rétractile



Stade initial

Stade terminal

lipodystrophie

panniculite mésentérique

mésentérite sclérosante/rétractile

ce schéma évolutif , beau comme l'antique et d'une simplicité biblique a été échafaudé à partir des éléments anatomo-pathologiques ; il n'a qu'un défaut qui est de n'être jamais observé en pratique courante , malgré l'assez grand nombre de cas typiques de panniculite mésentérique observés après 3 décennies de CT abdomino-pelviens (si vous avez un cas de filiation panniculite mésentérique-mésentérite sclérosante (d'ailleurs exceptionnelle!) ,publiez le!

panniculite mésentérique : caractères généraux

homme > femme, ≈ 60 ans, antécédents chirurgicaux

signes cliniques : fièvre, douleurs abdominales, troubles du transit, perte de poids, masse palpable, ou le plus souvent rien ou pas grand-chose

possible syndrome inflammatoire

prévalence des 5 signes TDM (B. Coulier JBR 2011)

- | | |
|--|-------|
| .hyper densité du tissu adipeux du mésentère | 100% |
| .avec effet de masse | 100% |
| .nodules parfois d'aspect "branchés "
si l'on épaissit les coupes
(sommation vaisseaux-nodules?) ; < 10 mm | 84,6% |
| .signe du halo graisseux « Fat-halo sign » | 61,5% |
| .pseudo capsule fibreuse (1 à 8 mm ; moy: 3mm) | 19,2% |



panniculite mésentérique : critères diagnostiques

diagnostic initial radiologique , TDM

Preuve histologique nécessaire

Pas d'histologie

=

abus de langage

Histologie autre

=

Diagnostics différentiels :

Processus infiltrants

Inflammation

Carcinomatose

Lymphomes

Infections (BK, Whipple)

Lipome , liposarcome

....

Histologie de panniculite

Idiopathique

Secondaire :

Sarcoïdose


LED

Polychondrite

M. de Horton

Fibrose multifocale

Tuberculose (pseudo panniculite mésentérique)



après 9 mois de traitement anti BK



Femme de 49 ans, douleurs abdominales et altération de l'état général.

TDM : aspect de ~~panniculite mésentérique~~



Anatomie pathologique : **tuberculose**

*Ege G. et al Mesenteric panniculitis associated with abdominal tuberculous lymphadenitis
Brit J Radiol 2002 ; 75 ; 378-380*

homme 55 ans douleurs abdominales atypiques ; pas d'antécédents notables , en particulier pas de chirurgie abdominale antérieure



diagnost



granulome lipophagique ganglionnaire
et de la paroi intestinale
post ingestion d'huiles minérales
employées comme lubrifiant dans
l'industrie alimentaire ? ? ?

Au total , que retenir de la panniculite mésentérique pour le quotidien



- **prévalence** : 7,8% dans une série prospective de 613 cas "tout venant" consécutifs avec 3 des 5 signes ; **3,4 % si on exige fat halo et pseudo capsule** ; 2 fois plus de cas sans lésion néoplasique qu'avec ! (B Coulier à paraître dans JBR)
- diagnostic théoriquement à confirmer par l'histologie :
 - biopsie sous scanner
 - biopsie par laparotomie si échec sous scanner
- traitement : Si SYMPTOMATIQUE
 - corticoïdes
 - colchicine
 - abstention thérapeutique
- évolution variable : stabilité, régression, majoration
- attention : si adénopathies > 10 mm, anomalies pancréatiques, ascite → SUSPECT, penser aux diagnostics différentiels

BIOPSIES :

- Coloration de Zielh
- PAS
- PCR Tropheryma Whippeli
- Immunomarquage

Surveillance clinique et TDM théoriquement nécessaire (?), non codifiée


homme 42 ans , douleurs intenses et persistantes de l'hypochondre droit ; Murphy +



infarctus de la partie droite du grand omentum

le repérage et l'identification du GO normal en scanographie haute résolution a fait l'objet d'un remarquable travail

COULIER B.64-row MDCT review of anatomic features and variations of the normal greater omentum
Surg Radiol Anat 2009;31:489-500




c'est sur l'identification des vaisseaux épiploïques sur des scanners "haute résolution" et en particulier des veines qui descendent verticalement dans le GO à partir de la grande courbure gastrique que l'auteur s'est appuyé pour préciser la longueur et la situation des parties droite et gauche du tablier épiploïque.


une mesure de l'épaisseur maximale de la graisse sous cutanée a été effectuée chez chaque patient, devant le muscle grand droit de l'abdomen, à hauteur de l'ombilic

une analyse statistique très détaillée des données recueillies chez des patients "normaux" (sans antécédents ni histoire clinique susceptible de modifier les images péritonéales) et avec une qualité d'image permettant les mesures a été réalisée.



des représentations volumiques 3D ont été faites sur des cas choisis pour illustrer les aspects pédagogiques

exemple de GO développé, symétrique, avec excellente visibilité de l'arcade vasculaire intraépiploïque de Haller et Barkow (flèche)






exemple de GO très court en hauteur et très épais



exemple de GO court développé préférentiellement du côté droit



exemple de GO en situation sous phrénique droite ,pré hépatique

COULIER B.64-row MDCT review of anatomic features and variations of the normal greater omentum
Surg Radiol Anat 2009;31:489-500



les principaux résultats de l' étude de B. Coulier
sont les suivants :

COULIER B.64-row MDCT review of anatomic
features and variations of the normal greater
omentum
Surg Radiol Anat 2009;31:489-500




- le GO) a pu être identifié et mesuré chez 100% des patients retenus pour l'étude
- chez les femmes , la partie gauche du GO est plus longue que la partie droite , et également plus longue que la partie gauche chez l'homme
- chez l'homme ,il n'y a pas de différence statistique de longueur entre les parties gauche et droite du GO, ni entre les parties droites du GO des femmes et des hommes
- la longueur totale du GO est très significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes
- chez l'homme , l'épaisseur moyenne du GO est parallèle à l'épaisseur maximale de la graisse sous cutanée; par contre chez les femmes, la prépondérance de la graisse sous cutanée par rapport à la graisse profonde ,péritonéale, est retrouvée (en Belgique comme ailleurs !)
- la constatation d'un GO en situation sous phrénique droite , en totalité ou en partie ,concerne très majoritairement les **hommes** chez qui elle est observée dans **32 %** des cas contre **2%** des cas chez les femmes . Ce "rideau" graisseux omental sus mésocolique **pourrait expliquer certaines difficultés de l'échographie hépatique chez l'homme**



exemple de GO
situé en
totalité du
côté gauche



GO sous phrénique,
pré-hépatique







Le grand omentum flotte dans les loges sous phréniques droite et gauche

Où se trouve le grand omentum




homme 37 ans , douleurs intenses et persistantes de l'hypochondre droit ; Murphy +



diagnostic








infarctus de la partie droite
droit du grand omentum
noter l'importance de
l'épaississement inflammatoire
du péritoine pariétal (flèches
vertes) expliquant l'intensité et
la persistance des douleurs
ainsi que la fixité des douleurs
et des images au cours des
mouvements respiratoires
La réaction inflammatoire
s'étend même à la graisse
propéritonéale et à la paroi
abdominale .





diagnostic






infarctus massif du grand omentum dans le post partum précoce . Nécrose de liquéfaction et organisation en collection à paroi épaisse (diagnostic chirurgical)



torsion ou infarctus d'appendice
épiploïque ou "appendagite primaire"




"appendagite" de la
jonction caeco-colique



"appendagite" du cul
de sac de Douglas




femme 42 ans ;douleurs abdominales antérieures après chirurgie bariatrique



diagnostic




appendagite du grand épiploon ; pas d'anomalie positionnelle du grand omentum;
intégrité du colon au contact , évolution "kystique"



diagnostic 

épilocèle ischémique : strangulation dans un diastasis des muscles grands droits. Notez l'importance de la réaction inflammatoire du péritoine pariétal de l'épilocèle, ainsi que du tissu cellulaire sous-cutané, expliquant le caractère très douloureux et l'irréductibilité fréquente.




Pathologies ischémiques de l'épiploon

Azaiez M, Zins M, Régent D, MC Jullès1,,
Genin G, Pilleul F, Bruel JM


Poster JFR 2007

ligament
rond


diagnostic




torsion d'une frange graisseuse
du ligament rond



frange graisseuse du
ligament rond




torsion d'une frange graisseuse
du ligament rond , ou infarctus
segmentaire d'un grand omentum
en situation sous hépatique
"infarctus du petit
omentum"....peu plausible





torsion d'une frange graisseuse
du grand omentum ascensionné
dans une hernie de la fente de
Larrey (hernie de Morgagni)

infarctus du petit omentum ???



homme 50 ans douleur thoracique aiguë , apyrétique ECG normal

Obs. Dr L. Hennequin
Centre d'Imagerie Jacques Callot
Nancy





torsion de frange graisseuse médiastinale
antérieure

Équivalent de la torsion d'un appendice épiploïque
dans l'abdomen

Comment dénommer cette pathologie



Epipericardial Fat Necrosis: Radiologic Diagnosis and Follow-Up

Victor Pineda¹
Jose Cáceres¹
Jordi Andreu¹
Jose Vilar²
Maria Luisa Domingo²

Pericardial fat necrosis is an uncommon benign condition of unknown cause. It presents as acute pleuritic chest pain in previously healthy persons associated with a well-defined nodularity on posteroanterior chest radiographs. This condition allows characteristic

Based on the clinical and radiologic findings, a tentative diagnosis of epipericardial fat necrosis was made.

Surg Today (2000) 30:739-743

 **SURGERY TODAY**
© Springer-Verlag 2000

Encapsulated Pericardial Fat Necrosis Treated by Video-Assisted Thoracic Surgery: Report of a Case

Downloaded from thorax.bmj.com on April 12, 2015
INOUE, SHOZO FUJINO, NORIAKI TEZUKA, SATORU SAWAI, KEIICHI KONTANI, JUN HANAOKA,
Shiga University of Medical Science, Seta, Otsu, Shiga 520-2192, Japan



Images in Thorax

Acute chest pain caused by pericardial fat necrosis




A 55-year-old woman presented at the emergency department with acute pleuritic chest pain. The pain was located on the left side of the sternum. Her relevant medical history revealed

Alors :

péricardique ?
épicardique ?
épi péricardique ?




Les franges grassesuses épi péricardiques selon E Pernkopf



La **graisse épi péricardique** (flèches bleues) ne doit pas être confondue avec la **graisse intra péricardique** qui entoure les axes vasculaires dans les sillons inter ventriculaires et atrio-ventriculaires (flèches vertes) qui a un rôle important dans l'athérogénèse.

la liponécrose ischémique des franges graisseuses épicaudiques se traduit par un tableau aigu thoracique ou épigastrique antérieur .


même dans la compétition des "petits PDL" qui semble résumer le diagnostic scanographique pour les régimes totalitaires du terrorisme antiradiations ionisantes , ne réduisez pas trop l'axe Z ...et conservez la notion de scanner TAP dans les tableaux aigus !



femme 29 ans douleurs de l'hypochondre droit
 quelle est l'anomalie visible
 a quoi correspond-elle




obs. Ph. Gay-Depassier , Annemasse




la rate est absente ;
splénectomie pour traumatisme
(chute de cheval) plusieurs années
auparavant

splénose de la poche de Morison et de la région cœliaque






toute l'histoire clinique et le diagnostic sont dans les images...!!!



splénose post splénectomie "de nécessité" lors de la pose d'une prothèse du segment thoraco-abdominal de l'aorte pour cure d'un anévrisme







femme, 43 ans, 4
enfants, pas de
douleurs abdominales ,
pas d'antécédents
chirurgicaux pelviens ni
obstétricaux .





diagnostic





Splénose post splénectomie après rupture traumatique de rate survenue 20 ans auparavant ; le rehaussement intense et homogène des nodules de splénose tant dans la loge de splénectomie que dans le grand omentum est très caractéristique ; l'absence d'antécédents gynécologiques et de symptômes évocateurs élimine l'endométriose.


femme, 36 ans; douleurs abdominales de type troubles fonctionnels



diagnostic




devant de petits nodules hypervascularisés disséminés du GO (et du mésentère) , le premier réflexe doit être de vérifier l'état de la loge splénique ...



Lorsque , comme ici , la rate est absente , le diagnostic de Splénose post splénectomie devient une très forte probabilité !!!

femme 46 ans , scanner réalisé pour bilan d'hématurie macroscopique, mais on n'objective pas d'anomalie évidente de l'appareil urinaire , par contre






splénose post
splénectomie , bien sur !



femme 36 ans , césarienne 1.5 mois
auparavant ,douleurs abdominales et syndrome
subocclusif

quelles sont vos hypothèses diagnostiques



GIST , LMNH , métastase (mélanome+++)
abcès paracolique d'origine diverticulaire .
tumeur à myofibroblastes , T desmoplastique
à petites cellules rondes


l'aspect de l'utérus et l'antécédent
obstétrical vous suggèrent-ils une autre
possibilité



léiomyome parasitique "kystisé" du mésentère

femme 46 ans , hystérectomie 5 ans auparavant

diagnostic



léiomyomatose disséminée



les **léiomyomes extra-utérins** sont décrits en fonction de leurs localisations sous plusieurs entités :

- .léiomyome bénin métastasiant,
- .**léiomyomatose disséminée**,
- .léiomyomatose intraveineuse (dans la VCI) ,
- .**léiomyome parasitique** (péritonéal ou rétropéritonéal)




toutes ces entités **peuvent coexister avec un/des léiomyomes utérins** ; leur survenue pourrait et paraît être favorisée par les gestes chirurgicaux utérins (césarienne , myomectomie , hystérectomie subtotale ..)

la iatrogénie paraît un facteur déterminant , **en particulier les interventions coelioscopiques sur l'utérus** ; les localisations sont essentiellement pelviennes , **le délai d'apparition peut être long (6 ans)**

*Fasih N., Prasad S., Macdonald D. ,et al.
Leiomyomas beyond the uterus: usual
localisations , rare manifestations
RadioGraphics 2006 ; 28:1931-48*

la pathogénie reste discutée puisque des formes ont été rapportées chez l'homme et chez la femme ménopausée

femme 46 ans , hystérectomie 5 ans auparavant




femme 36 ans , douleurs abdominales

léiomyomatose disséminée
avec localisations au GO


Uterine smooth-muscle tumors with unusual growth patterns: imaging with pathologic correlation
Cohen D.T , Oliva E., Hahn P.F., Fuller A.F Jr. and Lee S.I
Amer J Roentgenol AJR ;2007;188:246-255



femme 44 ans , douleurs pelviennes et constipation



léiomyomatose disséminée avec
atteinte massive du GO



femme 74 ans . Que peut -on évoquer devant ce type d'image



myxome de l'OG

caillot flottant intra cavitaire cardiaque


bourgeon néoplasique de la VCI propagé à l'atrium et au ventricule droits

adénocarcinome rénal +++,


carcinome hépato cellulaire



*Obs. M Lederlin
Bordeaux*


what else ???



2







hystérectomie 40 ans
auparavant

léiomyomatose de la VCI

