









femme 74 ans douleurs inguino-pelviennes droites, vomissements . Diagnostic







une anse grêle ectopique pelvienne , en arrière du muscle pectiné et en avant du muscle obturateur externe ; distension modérée du grêle en amont avec "feces sign" , sans signe d'ischémie sur les parois du grêle distendu (épaisseur et rehaussement normaux)






Occlusion mécanique de bas grade sur hernie obturatrice droite





muscle pectiné

muscle obturateur externe



Le siège et les rapports musculaires de l'intestin hernié sont largement suffisants pour affirmer le diagnostic ; les reformations multiplanaires (frontales) et les post traitements sont inutiles



Les signes de "souffrance" de la paroi sont modérés (discret épaissement oedémateux) et limités à la zone de striction dans l'anneau obturateur . C'est une hernie de Richter (pincement latéral partiel de l'anse) dont la réduction sera quasi spontanée lors de la laparotomie pratiquée 7 heures après le scanner



Exemple de hernie de Richter avec nécrose ischémique de la zone de striction et de la partie d'anse herniée . En pareil cas la réduction nécessite une dissection parfois difficile et la résection intestinale segmentaire s'impose !

Quelques données épidémiologiques

À l'inverse des hernies crurales , souvent rencontrées chez des femmes âgées obèses , les hernies obturatrices sont l'apanage des **femmes âgées maigres , souvent multipares et constipées** ("pousseuses" chroniques)

"little old ladie's hernia"

des auteurs anglophones ou angloscribes ...


Quelques données cliniques

-l'association d'un syndrome occlusif aigu , de douleurs de l'aîne et d'une **névralgie obturatrice** (douleurs irradiant à la face interne du genou et déficit moteur des adducteurs) constitue **le syndrome de Howship-Romberg** qui doit permettre le diagnostic clinique !

-l'abolition du réflexe des adducteurs associé au tableau précédent constitue le **syndrome de Hannington-Kiff** plus rare et moins connu mais plus spécifique



hernie obturatrice



hernie de Richter (pincement latéral)